

# CALENDRIER RÉGULIER DE VACCINATION

Certains vaccins sont recommandés pour tous. Ils font partie du calendrier régulier de vaccination.

Entre 2 et 23 mois		Entre 4 et 16 ans		Après 60 ans
À 2, 4, 6 et 18 mois	À 12 mois	Entre 6 et 23 mois	Entre 4 et 6 ans	En 4 <sup>e</sup> année du primaire
<b>DCaT-Polio-Hib</b>	<b>MÉNINGOCOQUE</b>	<b>INFLUENZA</b>	<b>DCaT-Polio</b>	<b>HÉPATITE B</b>
<b>PROTECTION CONTRE :</b> • la diphtérie (D) • la coqueluche (Ca) • le tétanos (T) • la poliomyélite (Polio) • les infections graves à <i>Haemophilus influenzae</i> de type b (Hib)	<b>PROTECTION CONTRE :</b> • l'infection à méningocoque de séro groupe C	En saison d'influenza <b>PROTECTION CONTRE :</b> • l'influenza (grippe)	<b>PROTECTION CONTRE :</b> • la diphtérie (D) • la coqueluche (Ca) • le tétanos (T) • la poliomyélite (Polio)	<b>PROTECTION CONTRE :</b> • l'hépatite B incluant une protection contre l'hépatite A
	À 12 mois <b>RRO-Var</b>			<b>VPH (filles)</b>
	<b>PROTECTION CONTRE :</b> • la rougeole (R) • la rubéole (R) • les oreillons (O) • la varicelle (Var)			<b>PROTECTION CONTRE :</b> • le virus du papillome humain (VPH)
À 2, 4 et 12 mois	À 18 mois		Entre 14 et 16 ans	
<b>CONJUGUÉ PNEUMOCOQUE</b>	<b>RRO</b>		<b>dcaT*</b>	
<b>PROTECTION CONTRE :</b> • les infections graves à pneumocoque	<b>PROTECTION CONTRE :</b> • la rougeole (R) • la rubéole (R) • les oreillons (O)		<b>PROTECTION CONTRE :</b> • la diphtérie (d) • la coqueluche (ca) • le tétanos (T)  Par la suite, rappel de d <sub>2</sub> T <sub>5</sub> tous les dix ans.	À 65 ans <b>INFECTIONS À PNEUMOCOQUE</b>
				<b>PROTECTION CONTRE :</b> • les infections à pneumocoque

\* Une dose de vaccin est aussi indiquée pour tous les adultes.

**D'autres vaccins peuvent être recommandés en raison de l'état de santé, du travail, des activités ou d'un voyage.**